

Cuidado en el Hogar para el Tratamiento de Conducto

Una vez que se ha sometido a un tratamiento de conducto, es importante que siga estas recomendaciones para asegurar su cicatrización.

Cómo cuidar una restauración provisional

Si le colocamos una obturación o corona provisional en su diente, no mastique durante al menos media hora para permitir que se endurezca la restauración.

Para mantener su restauración provisional en su lugar, no consuma alimentos duros o pegajosos, en especial, no mastique goma de mascar. Siempre que le sea posible, mastique sólo sobre el lado opuesto de su boca.

Es normal que se rompa o desgaste una parte pequeña de su obturación provisional, pero si se desgasta toda la obturación o si se desprende su corona provisional, llámenos para que podamos reemplazarla.



No consuma alimentos si tiene la boca adormecida



Tome los medicamentos según las instrucciones



Continúe utilizando el cepillo o seda hilo dental

Cómo masticar y consumir alimentos

Si le administramos anestesia durante el procedimiento, no mastique hasta que haya desaparecido completamente el adormecimiento. Es posible que sus labios, dientes y lengua permanezcan adormecidos durante varias horas.

Cepillado y uso de la seda dental

Cepille sus dientes y utilice normalmente la seda o el hilo dental.

Medicamentos y molestias

Si se le suministraron antibióticos, continúe tomándolos durante el período indicado aún cuando haya desaparecido todos los síntomas y signos de la infección.

Para controlar el malestar, tome un analgésico antes de que desaparezca completamente la anestesia o según las indicaciones que se le suministraron. Es normal que sienta molestias durante varios días después de un tratamiento de conducto, en especial, cuando mastica.

Para reducir cualquier molestia o inflamación, enjuague su boca con agua tibia y sal tres veces al día. Coloque más o menos una cucharadita de sal por vaso de agua tibia.

Cuándo debe llamarnos

Llame a nuestro consultorio si su mordida se siente despareja, tiene sensibilidad o molestia que aumenta o continúa después de los tres o cuatro días, en caso de que se desprendiera su obturación o corona provisional o si tiene alguna pregunta o duda.